

SARS-CoV-2-Infektions- bzw. COVID-19-Impfanamnese		Grundimmunisierung
1. Ereignis	2. Ereignis	
SARS-CoV-2-Infektion		ab Tag 29 nach PCR-Nachweis; Dauer bis einschließlich Tag 90 nach Infektion
1. Impfdosis	2. Impfdosis	ab Tag 15 nach 2. Impfdosis
SARS-CoV-2-Infektion	ab in der Regel 3 Monaten nach Infektion (ggf. früher; Rat des Arztes einholen) 1. Impfdosis	Gültig unmittelbar nach Impfung
1. Impfdosis	SARS-CoV-2-Infektion nach mind. 4 Wochen nach 1. Impfdosis	ab Tag 29 nach PCR-Testdurchführung
Johnson & Johnson-Impfung	2. Impfdosis	ab Tag 15 nach 2. Impfdosis
Johnson & Johnson-Impfung	SARS-CoV-2-Infektion nach mind. 4 Wochen nach 1. Impfdosis	ab Tag 29 nach PCR-Testdurchführung
SARS-CoV-2-Infektion	ab in der Regel 3 Monaten nach Infektion (ggf. früher; Rat des Arztes einholen) Johnson & Johnson-Impfung	Gültig unmittelbar nach Impfung